



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επηρεαζόμενες περιοχές από την ελονοσία στην Ελλάδα Περίοδος Μετάδοσης 2013

1

18 Οκτωβρίου 2013

Η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβίβαστες», εξέτασε

- τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την ελονοσία μέχρι τις 17/10/2013, τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των κρουσμάτων που έχουν εμφανιστεί, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίον ανήκουν καθώς και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων περιοχών,
- τα εντομολογικά ευρήματα από την ίδια περίοδο μετάδοσης,
- την βιβλιογραφία σχετικά με το εύρος πτήσης των ανωφελών κουνουπιών και ειδικότερα του *Anopheles sacharovi* που θεωρείται ο κύριος διαβίβαστής της ελονοσίας στη χώρα μας,
- τα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) για τον έλεγχο με ανοσολογικές και μοριακές μεθόδους για ελονοσία σε αιμοδότες που προέρχονται από τη Λακωνία (2009 -17/10/2013) και άλλες περιοχές της χώρας.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα η ΟΕ έκρινε ότι στις επηρεαζόμενες από ελονοσία περιοχές ανήκουν:

- ο Δήμος Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας και
- οι παρακάτω κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Αλεξανδρούπολης ΠΕ Έβρου
 - κοινότητα Φερών,
 - κοινότητα Αρδανίου,
 - κοινότητα Καβησού
 - κοινότητα Δορίσκου και
 - κοινότητα Πυλαίας.

A. Μέτρα, που αφορούν όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας επικοινωνούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ www.ekea.gr) και περιλαμβάνουν:

- **Εγρήγορση** όλων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για την εφαρμογή των κανονισμών επιλογής του αιμοδότη και παρακολούθηση της ιστοσελίδας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr για τα επιδημιολογικά και κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα κατά τη φετινή περίοδο μετάδοσης της ελονοσίας.
- **Αποκλεισμός** από την αιμοδοσία επισκεπτών από τις επηρεαζόμενες περιοχές για διάστημα **6 μηνών μετά την επιστροφή** τους. Η επίσκεψη θα πρέπει να περιλαμβάνει **τουλάχιστον μία διανυκτέρευση**, συμπεριλαμβανόμενης της παραμονής στην επηρεαζόμενη περιοχή από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο επισκέπτης μπορεί να γίνει αποδεκτός για αιμοδοσία νωρίτερα, εάν τα αποτελέσματα ανοσολογικής (IFAT, ELISA) **ΚΑΙ** γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας (PCR) είναι αρνητικά για ελονοσία.
- **Άτομα με ιστορικό ελονοσίας** μπορούν να αιμοδοτήσουν **3 έτη μετά** τη λήξη της θεραπείας και την απουσία συμπτωμάτων. Μετά από αυτή την περίοδο, γίνονται αποδεκτοί για αιμοδοσία μόνον εφόσον τα αποτελέσματα ανοσολογικής (IFAT, ELISA) **ΚΑΙ** γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας (PCR) είναι αρνητικά για ελονοσία.
- Συντονισμός από το Ε.ΚΕ.Α. όλων των απαραίτητων ενεργειών για διασφάλιση επάρκειας αίματος κατά την περίοδο της έξαρσης της δραστηριότητας της νόσου.

- Επίσης όσον αφορά την ελονοσία και τα μέτρα ασφάλειας του αίματος υπενθυμίζεται ότι:
 - **Άτομα που έζησαν τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής τους σε περιοχές ενδημικές για την ελονοσία¹**
Πρέπει να αποκλείονται από την αιμοδοσία για 3 έτη μετά την επιστροφή από την τελευταία επίσκεψη στην ενδημική περιοχή, υπό την προϋπόθεση, ότι δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε 4 μήνες, εάν τα αποτελέσματα ανοσολογικής (IFAT, ELISA) ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας (PCR) είναι αρνητικά για ελονοσία.
 - **Ασυμπτωματικοί επισκέπτες σε ενδημικές για την ελονοσία περιοχές¹**
Πρέπει να αποκλείονται από την αιμοδοσία για 6 μήνες μετά την αποχώρηση από την ενδημική για την ελονοσία περιοχή, εκτός εάν τα αποτελέσματα ανοσολογικής (IFAT, ELISA) ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας (PCR) είναι αρνητικά για ελονοσία.
 - **Άτομα με ιστορικό αδιάγνωστης πυρετικής νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός έξι μηνών από επίσκεψη σε ενδημική για την ελονοσία περιοχή¹**
Πρέπει να αποκλείονται από την αιμοδοσία για 3 έτη μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε 4 μήνες, εάν τα αποτελέσματα ανοσολογικής (IFAT, ELISA) ή γονιδιακής μοριακής δοκιμασίας (PCR) είναι αρνητικά για ελονοσία.

B. Μέτρα που αφορούν στις επηρεαζόμενες περιοχές (ΕΚΕΑ, www.ekea.gr):

- **Αποκλεισμός από την αιμοδοσία** ατόμων που κατοικούν & εργάζονται στις ανωτέρω περιοχές.
- Εγρήγορη των κλιμακίων αιμοληψίας των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για τη λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού και αυστηρότητα για την τήρηση των Κανονισμών Επιλογής του Αιμοδότη.
- Αναβολή για διάστημα 6 μηνών πληθυσμιακών αιμοληψιών στις επηρεαζόμενες περιοχές, εκτός και αν είναι εφικτός ο έλεγχος του αίματος για ελονοσία με μοριακή δοκιμασία (PCR).

Μέτρα Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ-ΚΕΕΛΠΝΟ)

- Οδηγίες προς τους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό αδιάγνωστης αιτιολογίας μετά την αιμοδοσία, να ενημερώσουν την Υπηρεσία, στην οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής.
- Σε περίπτωση μετάδοσης ελονοσίας μετά μετάγγιση αίματος/συμπυκνωμένων ερυθρών εφαρμόζεται αναδρομικός έλεγχος και μελέτη ανιχνευσιμότητας για την αναζήτηση και επανεξέταση των αιμοδοτών που εμπλέκονται στη μετάγγιση των ληπτών.

¹ Περισσότερες πληροφορίες για τις ενδημικές για την ελονοσία περιοχές μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

- <http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/malaria.htm> και
- <http://www.rbm.who.int/endemiccountries.html>